



A. Pereira Jordão

Cynodon Dactylon **TRANSCONTINENTAL**

Desenvolvida pela Pure Seed Testing, na Carolina do Norte, a Transcontinental representa uma nova geração com melhor qualidade, cor e performance. Com tolerância melhorada ao frio, para melhor sobrevivência ao Inverno, a Transcontinental permite obter relvados de qualidade e com boas performances, quer em condições de calor e humidade, quer em climas mais frescos e temperados.

· Tees, Fairways e Roughs de campos de golfe · relvados desportivos/parques · relvados residenciais e comerciais · áreas extensas · bermas · controle de erosão

Hábitos de Crescimento e Características

- Testada como PST-R69C
- Crescimento agressivo, prostrado e alastrante
- Densa e uniforme com cor verde muito escuro/folha de largura fina
- Sistema radicular profundo com rizomas agressivos
- Boa performance em vários tipos de solo, com pH compreendido entre 5.5-8.0

Características a Nível de Performance / Adaptabilidade

- Performances excepcionais nas categorias-chave, tais como, qualidade do relvado, cor, densidade, textura e tolerância ao frio, nos ensaios de bermuda NTEP 1997-2001
- Melhor sobrevivência ao Inverno, comparativamente a outras bermudas de semente
- Recuperação rápida após o Inverno
- Excelentes performances em condições de calor e humidade/para todas as regiões de adaptação da bermuda
- Requer muito pouca água / excelente tolerância à seca.
- Muito boa tolerância ao pisoteio, recuperando-se rapidamente.
- Tolerância à salinidade moderadamente boa
- Adaptada ao sol
- Moderadamente aberta para ressementeiras de Outono

Instalação e Manutenção

- Dose recomendada: 10-15 g/m²; semente revestida 20-25 g/m²
- Semear entre a Primavera e meio do Verão. Não se recomenda sementeiras no Outono
- Manter a cama de sementeira húmida durante a germinação e instalação do relvado.
- Com temperaturas óptimas de solo (18 e 26°C), a germinação dá-se em 10-14 dias. Não semear com temperaturas inferiores a 15.5 °C. O relvado deverá estar instalado em 8 semanas.
- Recomenda-se o primeiro corte quando a relva atingir os 2.5 cm.

Manutenção

- Para melhores resultados, aplicar cada mês de crescimento, 2.5 a 5 g/m² de N.
- Durante a estação de crescimento recomenda-se regas profundas e infrequentes
- Altura de corte recomendada: 1 a 3.8 cm (3/8 a 1.5")
- Para relvados de qualidade, recomenda-se renovação, arejamentos e topdressings, durante toda a estação de crescimento. Em zonas com Invernos frios, renovar no Verão. Conceder tempo suficiente para a recuperação antes das temperaturas baixarem.

- Para obter uma cor no Inverno, fazer overseed em Setembro/início do Outono, com variedades de Lolium perenne melhoradas, a 50-75 g/m²
-