



CD4

Cynodon dactylon

A Bermuda CD4 produz relvados de elevada qualidade, para utilização em fairways , tees e roughs de campos de golfe, campos desportivos, parques, parques infantis e relvados. Os avanços genéticos desta bermuda, permitem desfrutar de um bonito relvado em zonas climáticas tropicais e sub-tropicais de todo o mundo, incluindo zonas climáticas de transição, e em regiões secas do sul ou regiões áridas do sudeste da Europa.

Características

- Extraordinária tolerância à seca
- Menos exigente em água do que outras variedades
- Cor verde escuro
- Boa recuperação dos “divots”
- Textura de folha fina-média
- Maior densidade foliar
- Excelente retenção de cor no outono
- Elevada qualidade geral do relvado

Instalação e Manutenção

A melhor época para sementeira (dependendo da zona climática) é o fim da Primavera / início de Verão. A temperatura do solo deverá ser superior a 18°C, sendo o óptimo entre os 24 a 27°C. Sementeiras de Bermuda antes do dia 1 de Junho, em zonas de transição, pode aumentar a concorrência da *Poa annua*. Para uma sementeira bem sucedida, a dose deverá rondar os 100-150Kg/ha, em novas sementeiras e, para “overseeding”, serão necessários 50 Kg/ha. Para maximizar resultados, a semente deve manter um bom contacto com o solo, especialmente em “overseeding”. Em zonas com peladas, deverá ser usada a dose mais alta.

Sementeira

A CD4 deve ser semeada quando as temperaturas do solo estão, de forma consistente, acima dos 18°C. Para melhores resultados, antes de semear, deve-se fazer uma análise de solos e seguir as recomendações de fertilização. Ter o cuidado de não cobrir demasiado a semente; o recomendado será não cobrir a semente com mais de 6mm de terra. Após a sementeira, manter a cama de sementeira húmida durante cerca de 1 a 2 semanas; a germinação deverá ocorrer ao fim de 10 dias.



Germinação e instalação

Manter a cama de sementeira húmida, para melhorar a germinação. Em condições ideais, a germinação ocorre ao fim de 10 a 14 dias e deverá estar completa ao fim de 18 dias. O relvado deverá estar instalado ao fim de 30-60 dias (dependendo da época de sementeira).

Rega

Deve ser mantido um programa de regas durante 1 a 2 semanas após a sementeira de forma a garantir uma boa germinação. Após a instalação, deve-se dar preferência a regas profundas e frequentes, mas não tão frequentes como durante o período de instalação.

Fertilização

Durante a época de crescimento, o relvado necessita de 50 a 75 kg/ha de N (azoto) por mês. Com uma fertilização adequada, o relvado mantém-se denso e saudável e está mais bem preparado para o Inverno.

Corte

O primeiro corte deverá ser dado ao fim de 3 semanas após a sementeira. Recomenda-se não eliminar mais do que 1/3 da folha, em cada corte. A altura mínima de corte é de 13mm e a altura de corte recomendada é de 2cm.

Distribuído por:



Produzido por:

