



*Festuca arundinacea*



**Stonewall**, representa os avanços na obtenção de *Festucas arundinaceas* da melhor qualidade, verde escuras e resistentes a doenças. Foi seleccionada pela sua resistência ao "Brown patch" (*Rhizoctonia solanii*). A qualidade do coberto vegetal, a resistência a doenças e a sua durabilidade, tornam a **Stonewall** na escolha perfeita para relvados domésticos, campos desportivos, parques e roughs de campos de golfe.

#### DESTAQUES:

- Suporta bem o calor e a humidade da Zona de Transição
- Seleccionada pela sua cor verde escuro
- Excelente recuperação na Primavera
- Variedade com performances comprovadas em Ohio, Maryland e New Jersey
- Sistema radicular profundo, para uma melhor tolerância à seca

#### CARACTERISTICAS DA PERFORMANCE:

- Excelente resistência ao Brown Patch (*Rhizoctonia solanii*), 3º lugar na Carolina do Norte (relatório NTEP 04 -5)
- Classificada em 20º lugar, na categoria de cor genética (NTEP 03-1)
- Excelente instalação, mesmo em condições de pisoteio (NTEP 03 - 1)
- Excelentes classificações de qualidade, na Região de Montanha (NTEP 03-1)
- 3º lugar nas medições da altura do coberto vegetal (NTEP 03 - 1)
- Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em Auburn, AL (NTEP 04 -5)
- Colocada entre as 15% melhores, na qualidade, em Urbana, IL (NTEP 04 -5)
- Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em St. Louis, MO (NTEP 04 -5)
- Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em College Park, (NTEP 04-5)
- 8º lugar na classificação da qualidade em Brookings, SD (NTEP 04-5)
- 10º lugar na classificação da qualidade em Madison, WI (NTEP 04-5)

#### DESENVOLVIMENTO:

O bloco de reprodução da **Stonewall** foi plantado em Junho 1998. Consiste em 42 linhas - 13 das melhores linhas do bloco policruzado 96-8012, plantado no ensaio de 1996 em Enon, Ohio e 29 das melhores linhas do mesmo policruzado, plantado no ensaio de 1996 em Poolesville, Maryland. Com as plantas daí provenientes, foi plantado um bloco de 4200 plantas. Na Primavera de 1999, foram removidas 1470 plantas, antes da antese, por fraca resistência à ferrugem, cor da folha, textura da folha e baixa produção de semente. Antes da antese foram removidas outras 270 plantas. As restantes 2460 plantas foram colhidas como semente de propagação em Julho de 1999.

Produzido por:



Comercializado em Portugal por:

